

Fasan

Aus Asien; 500 v.Chr. nach Griechenland; dann mit Römern durch ganz Europa

Aussehen

Lebensraum 5 W's

Ernährung

Lebensweise: Tagaktiv, abends aufbaumen(Hahn meldet); gut zu Fuß;

Polygam 1:4 bis 1:6

Alt-Jung: Sporn

Paarungszeit März-Mai Hähne kämpfen

Brut: 24 Tage; 8-18 Eier; Nestflüchter; Küken Insekten; Flugfähig 14 Tage
Nur Henne, Nachgelege

Feinde : alles

Hege: Schützen,Biotop;Raubwild kurz

Jagdzeit: 16.10.-15.01

Aussetzverbot: 01.06.-15.01.

Rebhuhn

Einheimisches kleines Feldhuhn

Aussehen: Flügeldeckfedern männlich-weiblich

Lebensraum Acker-Öd-Heideflächen mit Hecken und Feldgehölzen

Ernährung

Lebensweise: Tagaktiv, Monogam; Frühjahr Paarhühner, Kette bis Spätwinter;
Abends und Morgens Lockruf des Hahnes

Alt-Jung: Abgerundete Schwingefedern, schwarzer Schnabel, gelbe Ständer
Spitze Schwingefedern, grauer Schnabel, graue Ständer

Paarungszeit März-April stille Balz

Brut: 24 Tage; 8-15 Eier; Nestflüchter; Küken Insekten; Flugfähig 14 Tage
Beide Eltern ziehen auf; Henne brütet alleine; Nachgelege

Feinde : alles

Hege: Schützen, Biotop; Raubwild kurz

Jagdzeit: bis 31.12.15 geschont; Ausnahmen nach Zählungen

Ringeltaube

Häufigste Taubenart

Aussehen

Lebensraum überall

Ernährung: überwiegend pflanzlich; Kropf Sand und Steinchen

Lebensweise: Tagaktiv, Stand-Strich und Zugvogel, Jahresruhe; Herbst große Schwärme

Alt-Jung: Jungvogel ohne Halsring Ständer blau-grau; alt Ständer karminrot

Paarungszeit Februar - Juli Balzflug; Balzruf

Brut: 16-18 Tage; 2 Eier weiß; Nesthocker; 1 Woche Kropfmilch von beiden;
Flugfähig 3-4 Wochen
Tauben und Tauben, 2-3 Bruten im Jahr

Feinde : alles

Hege:

Jagdzeit: 01.11.-20.02 Ausnahmegenehmigungen

Hohltaube

Aussehen

Lebensraum Waldgebunden

Ernährung: überwiegend pflanzlich; Kropf Sand und Steinchen

Lebensweise: Tagaktiv, Zugvogel(März-Oktober)

Paarungszeit März-August Balzruf monotones Rucksen

Brut: Höhlenbrüter 16-18Tage; 2 Eier weiß; Nesthocker; Flugfähig 3-4 Wochen
Taube und Tauber, 2-3 Bruten im Jahr

Feinde : alles

Hege:

Jagdzeit: geschont

Türkentaube

Aus Südosteuropa

Aussehen

Lebensraum überwiegend Stadtnah; Gehöfte

Ernährung: überwiegend pflanzlich; Kropf Sand und Steinchen

Lebensweise: Tagaktiv, Standvogel

Paarungszeit März-August Balzruf

Brut: 16-18Tage; 2 Eier weiß; Nesthocker; 1 Woche Kropfmilch von beiden;
Flugfähig 3-4 Wochen
Tauben und Tauben, 2-4 Bruten im Jahr

Feinde : alles

Hege:

Jagdzeit: 1.11.-20.02.

Turteltaube

kleinste Taubenart

Aussehen

Lebensraum lichte Wälder, Parks, Obstgärten

Ernährung: überwiegend pflanzlich; Kropf Sand und Steinchen

Lebensweise: Dämmerungsaktiv, Zugvogel(April-September)

Paarungszeit April- Juli gurren des Taubers

Brut: 16-18Tage; 2 Eier weiß; Nesthocker; Flugfähig 3-4 Wochen
Tauben und Tauber, 2 Bruten im Jahr

Feinde : alles

Hege:

Jagdzeit: geschont

Stockente

Schwimm-Tauchenten Unterschiede

Aussehen:

Lebensraum alle Gewässer

Ernährung: Allesfresser(90% pflanzlich); gründeln

Lebensweise: Tagaktiv, Mauser Ente wenn Junge flügge sind Juni
Erpel: Mai Kleingefieder; Juni-Juli Großgefieder; September Kleingefieder

Paarungszeit März-Mai Erpel bedrängen Enten; polygam

Brut: 26-29 Tage; 7-12 Eier; Nestflüchter sofort zum Wasser; Aufzucht 7-8
Wochen; brütet nicht nur am Wasser
Nur Ente; Nachgelege

Feinde : alles

Jagdzeit: 16.09.-15.01

Aussetzverbot: 01.06.-15.01.

Waldschnepfe

Aussehen Malerfeder; Schnepfenbart

Lebensraum Laubwälder, sumpfiges Gelände

Ernährung Pinzettenschnabel, schnelles Treten auf den Boden

Lebensweise: Zugvogel (März-Winterbeginn); Lagerschnepfen; Zick-Zack-Flug

Paarungszeit März-April Balzflug und Bodenbalz; polygam

Brut: 22 Tage; 3-5 Eier; Nestflüchter; Flugfähig 10 Tage; 5 Wochen selbstständig; nur Henne, bei Gefahr wegtragen der Jungen

Feinde : alles

Jagdzeit: 16.10.-15.01

Schnepfendreck